

Calendrier d'application • Treatment Calendar

Le calendrier d'application des traitements peut varier légèrement en fonction des températures propres à chaque région.
Les meilleurs résultats sont obtenus quand les températures du sol sont entre 12°C et 28°C.

The recommended treatment calendar may vary depending on the temperatures of different regions.
The best results are obtained when soil temperatures are between 12°C and 28°C.

| Insectes • Insects | Adulte • Adult | Larves • Larvae | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hanneton Commun June Beetle |  |  | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| Hanneton Européen European Chafer |  |  | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | |
| Scarabée japonais Japanese Beetle |  |  | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| Ver gris Cutworms |  |  | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Pyrale des prés Webworms |  |  | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Charançon de la vigne Black Vine Weevil |  |  | | | | | ■ | | | ■ | ■ | | | |



PÉRIODE D'APPLICATION OPTIMALE
OPTIMAL APPLICATION PERIOD

PÉRIODE D'APPLICATION
APPLICATION PERIOD

